

Maandkalender: activiteiten in de maand april

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
Management		
Verzorging	Rust en Regelmaat op de farm	Bevordert innesteling (tot half april!). (niet wetenschappelijk aangetoond)
Controleren AD	Reuen na de paring	Mogelijkheid tot voorkomen verspreiding AD
Bovenkooien	Afsluiten	Teven bewegen meer dan nodig is, moeilijker in conditie te houden. Beweging kost veel energie.
Cilinders	Verwijderen als plateau aanwezig is	Hygiëne in m.n. lactatieperiode
Vorbereiding werpen = voorkomen pupsterfte		
Voerverstrekking	Min 165 gram na paring, na 15 april 10 gram erbij, daarna vlak	Inspelen op pupontwikkeling in baarmoeder, voorkomen dat teven (begin) en pups (eind) te zwaar worden
Voerverstrekking	teven 'graag' houden = actief maar niet onrustig. Iedere dag vers voer	Doorvoed gevoel, zeker niet laten afvallen. Geen voerresten op kooi: hygiëne
Body Score	Niet laten groeien in de innestelperiode (JT tot ±3 april, OT tot ±10 apr). Laten stijgen in de drachtperiode, behalve voor BS 3+ en hoger.	Positief effect op fokresultaat door meer levend geboren pups en lager gust percentage.
Voerwagen en silo	Regelmatig schoon maken	Hygiëne = verlagen infectiedruk
Verplaatsen teven	Tussen 15 en 20 april net voor werpen	Vóór 10 april kans op embryonale pupsterfte (innesteling niet voltooid)
Schoonmaken nestkist, verkleiner plaatsen, stro verstrekken	Verwijderen voer en mestresten, aanbieden strooisel	Teven mogelijkheid tot maken mooi schoon nestje. Teven die een nest kunnen bouwen, verzorgen de pups beter.
Plaatsen inleghorren	Zo laat mogelijk plaatsen	Voorkomen pupverlies, mest regelmatig verwijderen: hygiëne en minder vliegen
Vlooiendoeder (in combinatie met vliegenbestrijding) in nestkist vóór werpen	Werkt enkele maanden, dus voldoende voor lactatieperiode	Bij regelmatig terugkerende vlooiendoeder ander middel gebruiken
Vanaf werpen		
Vanaf eerste nestje	's morgens vroeg controle rondje over heel de farm	Pas geboren pups die buiten nest liggen snel terug leggen
Bovenkooien	Afsluiten	Teef kan pups vergeten: uitval
Voerverstrekking	Dag van en na werpen weinig, vanaf dag 3 stijging afhankelijk van worpgrootte (1 tot 4%/dag mbv voercurven in autom. voedersysteem)	Belangrijk is correcte voergift teven met jongen: beperkte stijging van voergift, rustig opvoeren. Misschien nóg belangrijker voergift teven zonder jongen: hou ze 'graag'!
Overleggen pups	Uit heel grote nesten > 9 pups	Beste moeders: nesten met 6-8 pups. Tot 9 pups is pupgroei vergelijkbaar.
Signaleren melkziekte problemen	Geboorteproblemen, geen melk, mastitis, luid piepende pups, uitdroging	Raadpleeg uw dierenarts
Inspelen op specifieke weersomstandigheden	Klimaatbeheersing, zie hieronder	Inzicht zonder handeling brengt geen verandering!
Maart roert z'n staart en April doet wat ie wil		
Voerverstrekking	Voergift schema afhankelijk van het weer	Inspelen op pupontwikkeling in baarmoeder, voorkomen dat teven te zwaar worden
Bij guur weer	Extra stro (grof en gehakseld), nestkistverkleiners, sluipegatsluizen	Zodat teven zich kunnen wapenen tegen koude en tocht
Bij warm weer (en teef heeft geworpen)	Zorg dat nest kan luchten, vernevelen in de shed, verkoeling bij de dieren	Voorkomen dat teven (panisch) met pups gaan slepen met uitval tot gevolg. Melkproductie kost veel energie en geeft veel warmte, zorg dat teef dat kwijt kan.